



gastro4kids

Tájékoztató H2 kilégzéses vizsgálathoz

A vizsgálat kora reggeltől kb. délig tart.

A tesztoldat (fruktóz vagy laktóz) megívása után 2x negyed- és 4x félóránként kell a vizsgáló gépbe fújni. Akár egy lufi fújó versenyen. 😊

A kilégzéses vizsgálat reggel teljesen éhgyomorra történik.

Ez azt jelenti, hogy a gyermek nem ihat, nem ehet, és fogat sem moshat a vizsgálatot megelőzően. Rágó és a cukorka fogyasztása sem megengedett!

Amennyiben a gyermek beteg és/vagy gyógyszert szed, nem végezhető el a vizsgálat.

Nem tudjuk elvégezni a vizsgálatot, ha a gyermek az ezt megelőző 7 napban gyógyszert szedett. Amennyiben állandó gyógyszere van, kérjük, beszélje meg a vizsgálatot elrendelő kezelőorvossal!

A tesztoldat a következő panaszokat okozhatja a vizsgálat során: hányinger, hányás, hasmenés, haspuffadás. A vizsgálat teljes idejében a szülő és az asszisztens együttesen észleli a gyermeket. Tünet és panasz esetén, forduljon hozzánk bizalommal!

Köszönettel:

A gastro4kids csapata

